

KLINICKÝ PROTOKOL indikácií testovania metódou PCR na dôkaz SARS-CoV-2 (verzia 9)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva z dôvodu priaznivej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike ku dňu 19. 5. 2020 nasledovné úpravy k indikáciám pre odber vzoriek výterom z orofaryngu a nazofaryngu za účelom PCR diagnostiky suspektných alebo pozitívnych osôb v súvislosti s COVID-19:

Pacienti indikovaní na vyšetrenie na základe klinických príznakov

- Pacient (dospelý alebo dieťa) s akútnou infekciou dýchacích ciest - náhly nástup aspoň jedného z nasledujúcich symptómov: **kašeľ, telesná teplota nad 38 °C** po dobu 3 a viac dní bez inej etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz, resp. ak nie je známa epidemiologická anamnéza napr. anamnéza cestovania alebo pobytu v krajine/oblasti s lokálnym prenosom alebo prenosom v komunite, počas 14 dní pred objavením sa symptómov, alebo pri skupinách, ktoré majú výnimku prechodu cez štátne hranice (napr. nákladná, lodná doprava), **dýchavičnosť**.
- Pacient s akútnym respiračným ochorením, ktorý bol v posledných 14 dňoch pred objavením sa symptómov **v úzkom kontakte s potvrdeným COVID-19**.
- Klienti v zariadeniach sociálnych služieb alebo MRK s respiračnou infekciou (na indikáciu **všeobecného** lekára, infektológa, epidemiológa, alebo hygienika).
- Tehotné pacientky, ktoré prišli na pôrod akútne a majú respiračnú infekciu alebo kontakt s potvrdeným **(v posledných 14 dňoch)** alebo s pravdepodobným prípadom COVID-19 **(v procese vyšetrenia PCR)**.
- Pacienti pred akútnym operačným / **intervenčným** výkonom v celkovej anestézii s respiračnou infekciou a / alebo známym úzkym kontaktom alebo z karantény pre COVID-19.
- Pacienti na OAIM a JIS pri náhlom vývoji respiračnej insuficiencie s nejasnou etiológiou.
- Pacient vyžadujúci hospitalizáciu (SARI) a bez ďalšej etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz.

Pacienti indikovaní na vyšetrenie na základe epidemiologických a iných kritérií

- Úzke kontakty s potvrdenou infekciou COVID-19 (odobrať výter sa odporúča v 5. deň a **v prípade negativity zvážiť odber aj v 14. deň**).
- Pacient po prekonaní infekcie COVID-19 (nutnosť dvoch negatívnych PCR vyšetrení).
- Je možné zvážiť vyšetrenie exponovaných zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov pracujúcich v karanténnych centrách (napr. MVSR pri repartriácii, s ľuďmi bez domova), **MO SR, OZ SR pri práci s rizikovými skupinami (pre túto skupinu je možné stanoviť protilátky proti SARS-CoV-2 a do zátvorky (imunoanalýza, RDT test)**.
- Psychiatrickí pacienti, u ktorých nie je možné odobrať validnú objektívnu anamnézu alebo **s nízkou úrovňou dodržiavania epidemiologických štandardov**.
- Klienti a zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb a CDR, denných stacionároch alebo z MRK pri reaktívnom RDT na COVID-19.
- Traumatické stavy so zmenou vedomia a neurčité stavy na základe rozhodnutia lekára.
- Test pred odberom **orgánu od darcu za účelom transplantácie**.
- **Klienti po absolvovaní 14-dňovej karantény pred umiestnením do ZSS alebo CDR**.
- **Pacienti pred prepustením z nemocnice, ktorí boli hospitalizovaní pre respiračnú infekciu, febrilitu alebo z epidemiologických dôvodov z rozhodnutia lekára metódou PCR alebo pred umiestnením do bytového zariadenia sociálnych služieb a do CDR metódou RDT**.